PSYCHE LEUCOSOMA NOV. SP. VAN JAVA,

BESCHREVEN DOOR

P. C. T. SNELLEN.

(Pl. 14 fig. 1 en 1 *a*.)

Reeds vroeger ontving ik van deze nieuwe Psychide een Javaansch exemplaar (mas), dat echter zeer beschadigd was, doch bij de voorlaatste bezending van Mr. Piepers was een zeer gaaf, misschien gekweekt mannetje, echter zonder zak, waarnaar ik thans de soort wensch te beschrijven.

De vlugt is 15 mm. en de bouw, ofschoon merkelijk slanker, heeft zeer veel overeenkomst met onze Europesche *Unicolor* Hufn., alleen is de voorrand der voorvleugels gelijkmatig gebogen, hunne punt iets stomper, daarentegen die der achtervleugels minder afgerond; maar overigens vertoont de vorm der vleugels in het algemeen eene treffende gelijkenis.

Monddeelen geheel onontwikkeld; het onder en boven even breede, binnenwaarts afhellende aangezigt, dat tweemaal zoo breed is als de oogen, grijswit behaard, even als de kop, de thorax, het achterlijf en de pooten. Sprieten niet langer dan een vierde van den voorrand der voorvleugels, met van het laatste derde tot de punt vrij snel doch regelmatig in lengte afnemende, fijn bewimperde baarden, die op het midden van de schaft ongeveer zoo lang zijn als een derde van deze. Thorax langwerpig, gewelfd; achterlijf een klein weinig langer dan de achtervleugels, bijna zoo dun als bij *Psyche fusca* ♂.

Vleugels breed en kort, de voorrand der voorvleugels gelijkmatig

gebogen; de punt breed, afgerond; de achterrand half zoo lang als de voorrand, iets schuin, op ader 2 iets ingetrokken, overigens flaauw gebogen. Binnenrandshoek duidelijk doch stomp; binnenrand twee derden zoo lang als de voorrand. Achtervleugels even breed als de voorvleugels, hunne randen allen bijna even lang, de punt stomp doch duidelijk, de achterrand in het midden stomphoekig, de staarthoek afgerond. De kleur der boven- en onderzijde is donker roetbruin, iets glanzig, de bekleeding der vleugels bestaat uit schubben en de korte franje heeft eene bruine wortel- en eene witte buitenhelft.

Voorvleugels met 12 aderen, de binnenrandsader buitenwaarts gevorkt; op een derde van den bovensten tak met eene korte, terugloopende spoor. Ader 2—5 even ver van elkander, uit het laatste derde van den binnenrand der middencel, 6 en 7 uit de tusschen haar wortelwaarts gebogen dwarsader, 8 en 9 uit de stompe spits der middencel, gesteeld, de vleugelpunt omvattende, 10 en 11 in den voorrand. Middencel door eene gevorkte langsader gedeeld.

Achtervleugels met drie binnenrandsaderen en nog zeven andere. Middencel gevormd als die der voorvleugels, maar korter en breeder; ader 2, 3 uit haren binnenrand, 4 uit den staarthoek, 5, 6 uit de dwarsader, 7 uit de spits der middencel, op de helft door eene bogt met de mede aldaar gebogene ader 8 verbonden (zie afb.).

Niettegenstaande de overeenkomst in vleugelvorm met onze *Unicolor*, is er dus een tamelijk sterk verschil in het aderbeloop.

De pooten zijn ongeveer allen even lang, dun, ongespoord, bruin, witgrijs behaard.

Toeban, residentie Rembang (Piepers).

Als aanhangsel op deze beschrijving merk ik nog op, dat Butler, in de *Proc. of the Zoological Society* 1877 p. 381 op nieuw eene *Psyche*, van Nieuw-Zeeland, onder den naam *Unicolor* heeft beschreven. Daar *Psyche unicolor* Hufn. reeds 110 jaren ouder is, moet Butlers's soort verdoopt worden en sla ik voor de laatste den naam *Butleri* voor.